

## 你有以下問題嗎？

- 長新冠後遺症 — 腦霧？
- 難以尋找合適詞彙？
- 因為記憶力減退問題而影響工作表現？
- 記憶模糊？
- 難以記住名稱、地點？
- 忘記曾有的想法？
- 錯誤擺放物品？



## 一般針對早期記憶力減退的誤解\*

- 我只是年紀大了
- 我還年輕，不用擔心這問題
- 沒有人會明白
- 我沒有辦法可以處理這問題

\*早期記憶力減退是早期記憶障礙的症狀

維憶健®  
Vay-C® 有助緩解早期記憶力減退問題的  
特別醫療營養配方



## 簡易服用

劑量：建議每日服用一粒膠囊，或按醫護人員指示服用。

時間：可於早上或傍晚飯後服用。

膠囊：可原粒服用，或打開膠囊將粉末撒於食物中一同進食。

補服：如果你忘記服用一次，可隨時補服一粒，然後繼續依正常時間、劑量服用。



## 發揮最佳功效時間

30 至 90 天

請即向藥劑師及醫生查詢有關 維憶健® Vay-C®

食物敏感資訊：維憶健® Vay-C® 含魚類及大豆製品

經銷商：



+852 2211 3799 +852 2408 8905  
HK.KLNPharma.Info@KLN.com  
<https://www.pharma.kln.com>

維憶健®  
Vay-C®

有助緩解早期記憶力減退問題的  
特別醫療營養配方



盡早關注記憶力減退問題

一個健康正常的成年人，如患有早期記憶力減退，其記憶問題惡化至更嚴重的機會，將比其他人士高出

# 4.5-10倍<sup>1</sup>

早期記憶力減退是一個複雜的情況，可能與多種因素有關，例如：

- 長新冠引致的腦霧
- 年齡
- 家族病史有認知障礙症或阿滋海默氏症個案
- 基因
- 抑鬱、壓力、焦慮
- 三高引起的動脈粥樣硬化及糖尿
- 吸煙

## 及早關注早期記憶力減退問題至關重要

很多人誤以為早期記憶力減退是老化的必然階段

## 維憶健® Vay-C®

維憶健® Vay-C® 是有助緩解早期記憶力減退問題的**特別醫療營養配方**！

### 獨特組合配方

維憶健® Vay-C® 的獨特 PS-Omega-3<sup>#</sup> 配方，特別針對腦部而設，產生可直接輸送到腦部的脂質結構，有效提高生物利用度 (Bioavailability)，幫助平衡脂質。

<sup>#</sup> Phosphatidylserine (PS) 磷脂絲胺酸



臨床研究顯示<sup>2,3</sup>：



- 維憶健® Vay-C® 適合關注短期及長期記憶，以及學習能力問題的人士
- 安全可靠

## 其實一切在於脂質平衡

脂質或脂肪，在體內扮演重要角色，尤其是針對腦部及記憶。



事實上，我們腦部的6成重量來自脂質。

脂質不平衡是記憶力減退的其中一個主要因素。

## 維憶健® Vay-C®

有效幫助平衡脂質！

# 不要拖延。盡早關注記憶力減退問題。

Reference:

1. Reisberg B., et al. "Outcome over seven years of healthy adults with and without subjective cognitive impairment." *Alzheimer's Dement*, 2010 Jan; 6(1): 11-24.
2. Vakhapova, V., Cohen, T., Richter, Y., Herzog, Y., & Korczyn, A. D. (2010). Phosphatidylserine containing omega-3 fatty acids may improve memory abilities in non-demented elderly with memory complaints: A double-blind placebo-controlled trial. *Dementia and geriatric cognitive disorders*, 29(5), 467-474.
3. Vakhapova, V., Richter, Y., Cohen, T., Herzog, Y., & Korczyn, A. D. (2011). Safety of phosphatidylserine containing omega-3 fatty acids in non-demented elderly: a double-blind placebo-controlled trial followed by an open-label extension. *BMC neurology*, 11(1), 79.